



WSPA Sociedade
Mundial de
Proteção Animal

www.wspabrasil.org

Apoio:



1- PAUL, M.A.; CARMICHAEL, L.E.; CHILDERS, H. et al. 2006 AAHA Canine Vaccine Guidelines [disponível em www.aahanet.org].

2- PARDO, M.C.; TANNER, P.; BAUMAN, J.; SILVER, K.; FISCHER, L. Immunization of puppies in the presence of maternally derived antibodies against canine distemper virus. *Journal of Comparative Pathology*, v. 137, p. 72-75, 2007.

3- LARSON, L.J.; SCHULTZ, RD.D Effect of vaccination with recombinant canine distemper virus vaccine immediately before exposure under shelter-like conditions. *Veterinary Therapeutics*, v. 7, p. 113-118, 2006.



www.merial.com.br
0800 888 7387

O fim da Cinomose está em nossas mãos.

PR1413



Estes adesivos serão distribuídos gratuitamente. Solicite o seu!



Campanha Cinomose – Aqui não

Mais uma vez, a Merial e a WSPA estendem a mão para os cães ameaçados pela Cinomose, liderando a campanha Cinomose – Aqui Não, pelo segundo ano.

Entre abril e maio, meses que antecedem os surtos da doença no Brasil, 5% das doses de Recombitek® que forem vendidas pela Merial serão doadas à WSPA, que reúne entidades que cuidam de cães abandonados em todo o país.

Participe você também! Vacine o seu amigo com Recombitek® e ajude a Merial a acabar com este mal.

Acesse www.cinomose.com.br e saiba mais sobre esta campanha.



Conheça mais sobre a Cinomose

A Cinomose é uma doença viral que frequentemente leva à morte cães filhotes e adultos.

No Brasil, apenas 1 em cada 5 cães é vacinado contra a doença, anualmente*.

Os primeiros sintomas da Cinomose são:

- perda de apetite;
- falta de coordenação;
- vômito e diarreia;
- febre e apatia.

Alguns animais podem apresentar apenas sinais digestivos ou respiratórios.

A prevenção é a melhor arma contra este mal.

*dados da indústria.

Saiba mais sobre a vacinação contra a Cinomose

- Os cães podem ser vacinados a partir de 6 semanas de vida, sob indicação do Médico Veterinário.
- Normalmente, os filhotes recebem pelo menos 3 doses de vacina na primeira fase da vida. Eles são submetidos a um exame clínico com o objetivo de determinar se estão em condições de ser vacinados.
- Animais doentes, subnutridos ou parasitados devem ser tratados antes de receber a vacina.
- É recomendado que os filhotes permaneçam longe da rua e do contato com animais de histórico vacinal desconhecido, ou mesmo não vacinados.
- As vacinas contra a Cinomose não são todas iguais. As tradicionais do mercado contêm o vírus vivo atenuado e são utilizadas há muitos anos. Recentemente novas tecnologias vacinais foram desenvolvidas para a imunização de seres humanos e animais, com a máxima segurança e potência: as vacinas recombinantes. A vacina recombinante contra a Cinomose já está disponível no mercado e traz benefícios para a imunização de cães filhotes e adultos^{1,2,3}. Consulte seu Médico Veterinário sobre os benefícios da vacina recombinante para a imunização de seu cão.
- Um animal deve ser revacinado anualmente. A vacina contra a raiva, por exemplo, deve ser reaplicada todos os anos. Outras vacinas disponíveis podem ser aplicadas anualmente de acordo com a necessidade de seu animal.
- Consulte sempre seu Médico Veterinário. Ele é a pessoa indicada para determinar o protocolo de vacinação ideal para seu animal.

